

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGIO -

☎ 95.36.05.70



2. [EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 112
du 19 Janvier 1988

=====
" PACE E SALUTE A TUTTI "
=====

- les maladies du bois sur la vigne

EXCORIOSE

blanchiment
des écorces
et formation
des pycnides.

Sans être très fréquente, c'est une maladie présente dans notre région.

- au printemps et pendant la végétation, les bourgeons de la base des sarments débourent mal, puis on observe des crevasses noires en formes de "boutonnière" ou de plaques de "chocolat" à la partie inférieures des jeunes sarments. La base des rameaux enfle, se fendille et présente un étranglement. Ils deviennent fragiles et cassants.

crevasses
profondes et
étranglement
à la base
des rameaux.

- pendant l'automne, les écorces blanchissent et sont parsemées de points noirs ou pycnides.

Lutte

Avec de l'arsenite de soude à la dose de 625 g de matière active/hl

ESCA

Cette maladie devient d'année en année de plus en plus préoccupante. Qui n'a pas observé, au cours de l'été que les feuilles de certaines souches présentaient des décolorations débutant par le bord du limbe et évoluant entre les nervures ! le plus souvent feuilles et grappes se dessèchent ensuite brutalement. Si on fait une coupe transversale du bois, on observe que l'intérieur de celui-ci est altéré, mou, de couleur jaune clair, ressemblant à de l'amadou.

coupe longitudinale
bois dégradé en amadou au
centre de la souche



606 63422

(1988/89)

1988. 0012-134

P28

Lutte

--> Cette maladie pénètre par les grosses plaies de taille. Celles -ci devront être **protégées** par des pâtes ou mastics

--> Il faut **arracher et brûler** les souches mortes

--> L'arsenite de soude est un produit très actif, c'est le seul. Il s'utilise à la dose de 1 250 g de matière active/hl. (PYRALESCA RS, PYRALUMNOL 2000 PYRAL REP FORT à la dose de 5 litres par hl). Bien mouiller toutes les plaies de taille.

* l'arsenite de soude est un produit dangereux. L'utiliser *
* avec précaution par temps sec, pendant le repos végétatif. *
* Il doit être réalisé au moins **15 jours après** la taille *
* et au plus tard **15 jours avant le débour-remement** *

le traitement est à renouveler deux à trois années de suite dans les parcelles atteintes.

EUTYPIOSE

Cette maladie affecte un nombre très réduit de ceps. Elle se manifeste par un rabougrissement de la végétation (entre-noeuds courts, petites pousses, feuilles déformées). On observe également à l'intérieur de la souche des nécroses triangulaires.

Lutte

Les mesures préventives semblent actuellement seules valables (brûler les souches mortes, protéger les grosses plaies de taille).

- quelques remarques sur les laitues et scaroles

Nous rappelons que les traitements sont **interdits** lorsque les plants ont atteints le **stade 15/17 feuilles**.

Quoiqu'il en soit, les graves attaques de botrytis enregistrées précédemment ont été provoquées par une forte humidité que des techniques culturales mal adaptées ont favorisé (terrain insuffisamment préparé, mal drainé, enfouissement des mottes dans les buttes lors de la plantation, apport exagéré de fumure azotée et traitements fongicides trop tardifs).

* Un oubli s'est glissé dans la liste des produits du bulletin n° 111 - Ajouter le ROVRAL.

=====